

Defendyl[®]
Imunoglukan^{P4H}
junior



K21250SIHR/1/2021

Defendyl[®]
Imunoglukan^{P4H}
junior



Za odpornost¹

- IMG[®]
- Vitamin C

250 ml

¹Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Prehransko dopolnilo v tekoči obliki

MEDIS

Sestavine: voda, fruktoza, IMG[®] (pleuran, izoliran iz gobe bukov ostrigar), vitamin C (L-askorbinska kislina), sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska kislina), konzervans (kalijev sorbat).

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

	Telesna masa (kg)	Priporočena količina (ml)	IMG [®] (pleuran, izoliran iz gobe bukov ostrigar) (mg)	Vitamin C (mg)
Otroci	15	3	30	30 (38 % PDV/RDA)
	20	4	40	40 (50 % PDV/RDA)
	25	5	50	50 (63 % PDV/RDA)
	30	6	60	60 (75 % PDV/RDA)
Odrasli	70	14	140	140 (175 % PDV/RDA)

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos)

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite po 1 ml tekočine/5 kg telesne mase, enkrat na dan, 2 do 3 mesece. Pri povečanih potrebah jemljite prvih pet dni dvojni odmerek. Tekočino vzemite na prazen želodec zjutraj pol ure pred zajtrkom ali zvečer pred spanjem. Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. **Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior** je primeren tudi za diabetike in vegetarijance. Ne vsebuje glutena in laktoze.

Opozorila: Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

Shranjevanje: Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi od 5 do 25 °C, zaščiten pred vlago in neposredno sončno svetlobo. Po prvem odprtju hranite izdelek v hladilniku pri temperaturi od 2 do 8 °C in ga porabite v treh mesecih.

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija.
www.defendyl.si



Defendyl[®]
Imunoglukan^{P4H}
junior



Za odpornost¹

- IMG[®]
- Vitamin C

250 ml

¹Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkega sistema.

Tekući dodatak prehrani

MEDIS

Sastojci: voda, fruktoza, IMG[®] (pleuran, izoliran iz gljive bukovače), vitamin C (L-askorbinska kislina), regulator kislosti: limunska kislina, konzervans: kalijev sorbat.

Priporočena dnevna doza:

	Tjelesna masa (kg)	Priporočena količina (ml)	IMG [®] (pleuran, izoliran iz gljive bukovače) (mg)	Vitamin C (mg)
Djeca	15	3	30	30 (38 % PU)
	20	4	40	40 (50 % PU)
	25	5	50	50 (63 % PU)
	30	6	60	60 (75 % PU)
Odrasli	70	14	140	140 (175 % PU)

PU (priporočeni unos)

Kao pomoć funkciji imunološkog sustava, uzimajte 1 ml tekućine/5 kg tjelesne mase jedanput na dan, kroz 2 do 3 mjeseca. Kod povećanih potreba preporučuje se uzimanje dvostruke doze u prvih pet dana. Tekućinu je potrebno uzimati na prazan želudac ujutro ili navečer prije spavanja. Prije upotrebe bočicu je potrebno dobro protresti.

Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior je primjeren za dijabetičare i vegetarijance. Ne sadrži gluten i laktozu.

Napomena: Čuvati od dohvata male djece! Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.

Upozorenje: Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior ne smiju koristiti bolesnici sa presadenim organima. Bolesnici koji su na terapiji imunosupresivima mogu uzimati Defendyl-Imunoglukan P4H[®] junior samo nakon savjetovanja s liječnikom.

Čuvanje: Čuvati pri temperaturi od 5 do 25 °C, zaštićeno od vlage i direktne sunčeve svjetlosti. Nakon prvog otvaranja čuvati proizvod u hladnjaku pri temperaturi od 2 do 8 °C te ga upotrijebiti u roku od tri mjeseca.

Proizvođač: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija u suradnji s Pleuran, s.r.o., EU

Odgovoran za RH: Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb. www.defendyl.hr

Serijski:

Uporabno najmanj do/
Najbolje upotrijebiti do: