

NAVODILO ZA UPORABO

neo-angin[®]

brez sladkorja z okusom češnje

1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg pastile

2,4-diklorobenzilalkohol/amilmetakrezol/levomentol

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v **3 – 4 dneh**, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje
3. Kako jemati zdravilo neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO NEO-ANGIN[®] BREZ SLADKORJA Z OKUSOM ČEŠNJE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje je antiseptik in blag analgetik za usta in žrelo.

Namenjeno je za zgodnje lokalno zdravljenje blagih okužb ust in žrela, s čimer se lahko zmanjša tudi poraba antibiotikov. Te okužbe povzročijo vnetja ustne votline in žrela s simptomi, kot so bolečine v žrelu in hripavost, vnetja ustne sluznice in vnetja dlesni.

2. KAJ MORATE VEDETI PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO NEO-ANGIN[®] BREZ SLADKORJA Z OKUSOM ČEŠNJE

Ne jemljite zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilne učinkovine ali katerikoli sestavino zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje. Te so našteje v 6. poglavju »Dodatne informacije«.
- če je otrok mlajši od 6 let.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje

Posvetujte se s svojim zdravnikom, če karkoli izmed spodaj navedenega velja za vas:

- če se vaše težave po 3 – 4 dnevem jemanju zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje ne izboljšajo ali se celo poslabšajo;
- če imate dolgotrajen (kronični) kašelj ali hripavost. Omenjena simptoma sta lahko posledica morebitnih malignih obolenj.

Jemanje drugih zdravil

Ni znano, da bi zdravilo neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje vplivalo na delovanje drugih zdravil. Priporočamo, da hkrati ne jemljete drugih zdravil za oralno uporabo, to je za uporabo v ustni votlini in žrelu.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje skupaj s hrano in pijačo

Na voljo ni podatkov, ki bi dokazovali, da hrana ali pijača vplivata na delovanje zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje. Neposredno po jemanju zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Podatkov o uporabi zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje pri nosečnicah ni.

Opravljenе raziskave na živalih niso pokazale neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov v zvezi z nosečnostjo, razvojem zarodka oz. ploda, med porodom ali po porodu.

Uporabe zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje med nosečnostjo in dojenjem ne priporočamo, ker ni dovolj podatkov o varnosti uporabe zdravila v teh obdobjih.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, vendar ni pričakovati, da bo vplivalo na te sposobnosti.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje

- To zdravilo vsebuje barvilo rdeče 4R (E124), ki lahko povzroči alergijske reakcije.
- Zdravilo vsebuje tudi butilhidroksianizol (E320), ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ali draženje oči in mukoznih membran.
- Zdravilo vsebuje propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože.
- Zdravilo neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje vsebuje nadomestek sladkorja, izomalt. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev (imate intoleranco za nekatere sladkorje), se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.
- Ena pastila zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje vsebuje 2,58 g izomalta. Količina izomalta v eni pastili ustreza 25 kJ (5,9 kcal). To morajo upoštevati bolniki s sladkorno boleznijo (diabetes mellitus).

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO NEO-ANGIN[®] BREZ SLADKORJA Z OKUSOM ČEŠNJE

Pri jemanju zdravila neo-angin[®] brez sladkorja z okusom češnje natančno upoštevajte navodila za pravilno uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte s farmacevtom.

Navodila za pravilno uporabo

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje je namenjeno za uporabo v ustih in žrelu (oralna uporaba). Odrasli in otroci, starejši od 6 let, počasi raztopite v ustih po eno pastilo, na vsake 2 do 3 ure. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Zdravljenje lahko traja 3 – 4 dni. Če se vaše težave v tem času ne izboljšajo, ali se celo poslabšajo, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje, kot bi smeli

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, se v primeru neželenih učinkov posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zaenkrat ni znanih primerov prevelikega odmerjanja tega zdravila. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, je možno, da se bo pojavilo draženje ustne ali želodčne sluznice.

Če ste pozabili vzeti zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki so navedeni po pogostnosti:

zelo pogosti	pojavi se pri več kot 1 od 10 bolnikov
pogosti	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
občasni	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1000 bolnikov
redki	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov
zelo redki	pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
neznana pogostnost	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih:

Zelo redki:

- draženje ustne sluznice,
- draženje želodčne sluznice.

Neznana pogostnost: možne so tudi alergijske reakcije.

Če se pojavi alergijska reakcija, prenehajte jemati pastile in se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA NEO-ANGIN® BREZ SLADKORJA Z OKUSOM ČEŠNJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatlici in pretisnem omotu, poleg oznake »Uporabno do«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje, če opazite, da so se pastile raztopile.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje

Zdravilne učinkovine so:

Ena pastila vsebuje naslednje zdravilne učinkovine:

2,4-diklorobenzilalkohol	1,20 mg
amilmetakrezol	0,60 mg
levomentol	5,90 mg

Pomožne snovi so: eterično olje poprove mete, izomalt, vinska kislina, aroma češnje (vsebuje butilhidroksianizol (E320) in propilenglikol (E1520)), rdeče 4R (E 124), indigotin (E132).

Izgled zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje in vsebina pakiranja

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje je v obliki pastil. Pastile so rdeče barve, okrogle in rahlo prosojne. Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje je na voljo v škatlah z 12 ali s 24 pastilami (dva pretisna omota s po 12 pastilami).

Način izdaje zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom češnje

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:

DIVAPHARMA GmbH, Motzener Straße 41, D-12277 Berlin, Nemčija

Navodilo je bilo odobreno 1.10.2009.