

Navodilo za uporabo

Strepsils z okusom medu in limone 0,6 mg/1,2 mg pastile amilmetakrezol/diklorobenzilalkohol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v sedmih dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Strepsils z okusom medu in limone in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils z okusom medu in limone
3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils z okusom medu in limone
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Strepsils z okusom medu in limone
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Strepsils z okusom medu in limone in za kaj ga uporabljamo

Amilmetakrezol in diklorobenzilalkohol imata antiseptične lastnosti.

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone uporabljamo za ublažitev simptomov vnetja žrela in okužb v ustni votlini in žrelu.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils z okusom medu in limone

Ne uporabljajte zdravila Strepsils z okusom medu in limone

- če ste alergični na zdravilni učinkovini ali katerokoli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- pri otrocih, mlajših od 5 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Strepsils z okusom medu in limone se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če že dlje časa kašljate ali če ste hripavi, se posvetujte z zdravnikom.

Priporočenih odmerkov zdravila Strepsils z okusom medu in limone ne smete preseči.

Druga zdravila in zdravilo Strepsils z okusom medu in limone

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katerokoli drugo zdravilo.

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na učinke zdravila.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ker ni dovolj podatkov o varnosti uporabe zdravila Strepsils z okusom medu in limone med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva.

Podatki o vplivu zdravila Strepsils z okusom medu in limone na plodnost niso na voljo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone vsebuje glukozo in saharozo

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils z okusom medu in limone

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je:

Odrasli in mladostniki, starejši od 15 let: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Otroci in mladostniki, stari od 8 do 15 let: ena pastila 4-krat na dan.

Otroci, stari od 5 do 7 let: ena pastila 3-krat na dan.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Strepsils z okusom medu in limone, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Preveliko odmerjanje lahko povzroči želodčne in črevesne težave.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Strepsils z okusom medu in limone

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Spodnji seznam neželenih učinkov se nanaša na kratkotrajno uporabo zdravila Strepsils z okusom medu in limone. V primeru dolgotrajnega zdravljenja kroničnih težav se lahko pojavijo dodatni neželeni učinki.

Možni neželeni učinki, ki se lahko pojavijo:

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- preobčutljivostna reakcija, otekanje ust in žrela, pekoč občutek v ustih in žrelu, zbadanje v ustih, izpuščaj

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- boleč jezik

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- prebavne motnje, slabost

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika

Center za zastrupitve

Zaloška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

Faks: + 386 (0)1 434 76 46

e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Strepsils z okusom medu in limone

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Strepsils z okusom medu in limone

- Zdravilni učinkovini sta amilmetakrezol in diklorobenzilalkohol. Ena pastila vsebuje 0,6 mg amilmetakrezola in 1,2 mg diklorobenzilalkohola.
- Druge sestavine zdravila so: med, vinska kislina, eterično olje poprove mete, eterično olje limone brez terpenov, kinolinsko rumeno (E104), tekoča glukoza in tekoča saharoza.

Izgled zdravila Strepsils z okusom medu in limone in vsebina pakiranja

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone je na voljo v obliki rumenih, okroglih pastil s Strepsils "S" zaščitnim znakom na obeh straneh.

Na voljo so v škatli iz pločevine z 12 pastilami (1 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije) in v škatli iz kartona s 24 pastilami (2 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije).

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Velika Britanija

Odgovoren za trženje v Sloveniji

PharmaSwiss d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 23 64 700

Izdelovalec

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane Road, Nottingham, NG90 2DB,
Velika Britanija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

20. 8. 2014