

NAVODILO ZA UPORABO

STREPSILS VITAMIN C Z OKUSOM POMARANČE pastile amilmetakrezol/diklorobenzilalkohol/askorbinska kislina/natrijev askorbat

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v sedmih dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče
3. Kako jemati zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO STREPSILS VITAMIN C Z OKUSOM POMARANČE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Amilmetakrezol in diklorobenzilalkohol imata antiseptične lastnosti.

Zdravilo vsebuje tudi vitamin C, ki krepi obrambne sposobnosti telesa in pripomore k hitrejši ozdravitvi.

Zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče je namenjeno za ublažitev simptomov vnetega žrela in okužb v ustih in žrelu.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO STREPSILS VITAMIN C Z OKUSOM POMARANČE

Ne jemljite zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

- Če ste alergični (preobčutljivi) na katerokoli sestavino zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče.
- Otroci, mlajši od 5 let.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

- Če že dlje časa kašljate ali če ste hripavi, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Ne prekoračite predpisanega odmerka.

Jemanje/uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na učinke zdravila.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. Ker ni dovolj podatkov o varnosti zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

Vsaka pastila vsebuje glukozo in saharozo.

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Propilenglikol lahko povzroči draženje kože in sluznice.

Zdravilo vsebuje tudi majhne količine etanola (alkohola), in sicer manj kot 100 mg na odmerek.

To zdravilo vsebuje barvili E110 in E124, ki lahko povzročita alergijske reakcije.

Alergijske reakcije so pogostejše pri ljudeh, ki so preobčutljivi za acetilsalicilno kislino.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO STREPSILS VITAMIN C Z OKUSOM POMARANČE

Pri jemanju zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče natančno upoštevajte predpisano odmerjanje. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli in otroci, starejši od 15 let: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite po eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil.

Otroci med 8 in 15 let: 1 pastila 4-krat dnevno.

Otroci med 5 in 7 let: 1 pastila 3-krat dnevno.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Preveliko odmerjanje lahko povzroči želodčne in črevesne težave.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Spodnji seznam neželenih učinkov se nanaša na kratkotrajno uporabo zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče. V primeru dolgotrajnega zdravljenja kroničnih težav se lahko pojavijo dodatni neželeni učinki.

Pogostnost neželenih učinkov je navedena na naslednji način:

zelo pogosti	pojavi se pri več kot 1 od 10 bolnikov
pogosti	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
občasni	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov
redki	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov
zelo redki	pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov

Možni neželeni učinki, ki se lahko pojavijo:

Občasni: preobčutljivostna reakcija, otekanje ust in žrela, pekoč občutek v ustih in žrelu, zbadanje v ustih, izpuščaji

Redki: boleč jezik

Zelo redki: prebavne motnje, slabost

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA STREPSILS VITAMIN C Z OKUSOM POMARANČE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

Zdravilne učinkovine so: amilmetakrezol, diklorobenzilalkohol, askorbinska kislina in natrijev askorbat. 1 pastila vsebuje 0,6 mg amilmetakrezola, 1,2 mg diklorobenzilalkohola, 33,50 mg askorbinske kisline in 74,90 mg natrijevega askorbata, kar ustreza 66,50 mg proste askorbinske kisline.

Pomožne snovi so: levomentol, vinska kislina, aroma pomaranče (etanol in bergamotkino olje), propilenglikol, oranžno FCF (E110), rdeče 4R (E124), tekoča glukoza, tekoča saharoza.

Izgled zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče in vsebina pakiranja

Zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče je na voljo v obliki oranžnih, okroglih pastil z okusom pomaranče in s Strepsils zaščitnim znakom "S" na obeh straneh.

Na voljo so v kartonski škatli s 24 pastilami (2 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije).

Način izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire
SL1 3UH, Velika Britanija

Odgovoren za trženje v Sloveniji

PharmaSwiss d.o.o, Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane Road, Nottingham, NG90 2DB,
Velika Britanija

Navodilo je bilo odobreno

6. 5. 2013